Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Opiaten screening

Beschrijving van de test

Naam:	Opiaten screening
Synoniemen:	Opiaten
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 2 weken
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	Ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Volume:	10 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2)Stalen gelabeld; 3)In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Homogenous enzyme immunoassay (Siemens Healthineers); GC-MS
Interferentie:	Positieve interferentie van ofloxacine of levofloxacin.
Interpretatie:	De immunoassay screeningstest is gecalibreerd met morfine en scoort positief vanaf 300 ng/mL morfine. Niet alle opiaten worden gedetecteerd, de detectielimiet van de mogelijk wel gedetecteerde opiaten verschilt naargelang de component.

Tarificatie

Nomenclatuur:	547794 - 547805 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 5)(Cumulregel 73)(diagnoseregel 49) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

03-04-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.