

## Sirolimus

### Beschrijving van de test

Naam:	Sirolimus
Synoniemen:	Sirolimus
Aanvraag code:	SIROLI
Loinc:	29247-4
Frequentie:	Immunoassay (in house): dagelijks, behalve op zondag. LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): analyse op maandag, woensdag en vrijdag
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Immunoassay (in house): van maandag t.e.m. zaterdag: indien staal in labo vóór 13h: resultaat zelfde dag gekend. LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): 2 dagen
TAT Dringend:	3 uur
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

### Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt <b>Analyse via LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): afname niet mogelijk op vrijdag! Stalen afgenomen op donderdag moeten vóór 16u in het labo zijn.</b>
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen).

### Analyse

Analysemethode: Immunoassay (in house): Elecsys (Cobas, Roche); LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): in house methode.  
Deelname EKE: LGC Immunosuppressant Scheme: PT-IP-SIR  
Interferentie: Immunoassay (in house): kruisreactie met everolimus. Interferentie bij biotine inname (>5 mg / dag) 8 uur voor de bloedafname; of bij hoge titers van antilichamen van streptavidin of ruthenium.  
Eenheid: µg/L

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.0-15.0 µg/L	5.0-15.0 µg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregul [46](#), [51](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

25-03-2026