

Tacrolimus

Beschrijving van de test

Naam:	Tacrolimus
Synoniemen:	Prograft, FK506
Aanvraag code:	29158
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	11253-2
Frequentie:	dagelijks, behalve op zondag
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	van maandag t.e.m. zaterdag: indien staal in labo vóór 13 hr: resultaat zelfde dag gekend
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen).

Analyse

Analysemethode:	Immunoassay: Elecsys (Cobas, Roche)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	LGC Immunosuppressant Scheme: PT-IP-TAC
Interferentie:	

Interferentie bij biotine inname (>5 mg / dag) 8 uur voor de bloedafname; of bij hoge titers van antilichamen van streptavidin of ruthenium.

Eenheid: $\mu\text{g/L}$

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.0-20.0 $\mu\text{g/L}$	5.0-20.0 $\mu\text{g/L}$

Tarificatie

Nomenclatuur: 548413 - 548424 B 600 Doseran van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel [40](#), [227](#))(Diagnoseregul [46](#), [51](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

20-05-2026