Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# f12 Erwt IgE antistoffen

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | f12 Erwt IgE antistoffen |
| Synoniemen: | Erwt, Pisum sativum |
| Aanvraag code: | IgE_f12 |
| Loinc: | 6204-2 |
| Frequentie: | wekelijks |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 2 weken |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | Apr. biol. Louis Nevejan |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten materiaal: | Plasma |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube, Li heparine tube |
| Volume: | 2,7 mL |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | 1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2)Stalen gelabeld; 3)In conform recipiënt |
| Bijaanvraag: | mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag ( 5 dagen) |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay) |
| Deelname EKE: | Ja |
| Interpretatie: | Opsporen van de vermoedelijke oorzaak van allergie. De hoogte van de specifieke IgE titer tegen het allergeen correleert echter niet steeds met de ernst van de symptomen. Deze worden eerder bepaald door de hoogte van Totaal IgE. |
| Eenheid: | kU/L |

## Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| | 0.1 kU/L | 0.1 kU/L |

## Tarificatie

Nomenclatuur: 556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel 47)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

## Laatst gewijzigd op

07-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.