

Mycoplasma pneumoniae IgG antistoffen in CSV

Beschrijving van de test

Naam:	Mycoplasma pneumoniae IgG antistoffen in CSV
Aanvraag code:	56146
Frequentie:	1 x per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	8 uur - 7 dagen
TAT Dringend:	24 uur
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	CSV
Toegelaten recipiënt:	Steriele tube
Volume:	250 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. AFAZFAB00007 Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie
Bijaanvraag:	Indien het lumbaal vocht een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:

Immuno-enzymatische test (ELISA) bij onderzoek van gepaard serum en CSV in kader van recurrenente (RALM of Mollarets syndroom) of doorgemaakte meningo-encephalitis.
Chemiluminescentie immunoassay (CLIA) voor screening van sera.

Deelname EKE: INSTAND

Interferentie: Lumbaal vocht waarin bloed aanwezig is, geeft minder betrouwbare resultaten.

Interpretatie: Specifieke IgG bepaling in CSV niet informatief als waarde op zich, wel essentieel als parameter binnen intrathecale index (CSV/serum) van specifieke IgG antistoffen. Intrathecale indices zijn complementair aan moleculaire testen op CSV. In de vroege fase van CZS infectie zal de pathogeen vanaf 24h à 72h post-onset van symptomen detecteerbaar zijn gedurende een aantal dagen (afhankelijk van het causaal agens, het klinisch verloop en al dan niet opstarten van antimicrobiële therapie). Serologie in CSV wordt nuttig vanaf 7 à 10 dagen na start van symptomen, en kan gebruikt worden voor (retrospectieve) diagnostiek van CZS-infectie in de subacute of convalescente fase van infectie. Ook bij recurrenente atypische lymfocyttaire meningitis (RALM) of recidiverende infecties, waar de PCR vaak negatief blijkt is deze antistof-index (vnl. voor HSV-virussen) van nut. Bijkomend wordt een intrathecale polyspecifieke antivirale immuunrespons (minstens 2 intrathecale indices $\geq 1,5$) beschouwd als de meest specifieke CSV merker voor MS-diagnostiek.

Eenheid: U/mL

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 8.00

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system