

## f225 pompoen IgE antistoffen

### Beschrijving van de test

Naam:	f225 pompoen IgE antistoffen
Synoniemen:	Pompoen, courgette, zucchini, Cucurbita pepo
Aanvraag code:	IgE_f225
Loinc:	6854-4
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li heparine tube
Volume:	2,7 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2) stalen gelabeld; 3) in conform recipiënt
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag ( 5 dagen)

### Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
Deelname EKE:	SCIENSANO/UKNEQAS
Interpretatie:	<b>Let op:</b> Deze bepaling is zowel bruikbaar voor pompoen als voor courgette. De bepaling geeft een indicatie over allergie ten aanzien van alle variëteiten van de soort <i>Cucurbita pepo</i> .

Opsporen van de vermoedelijke oorzaak van allerg  
Eenheid: kU/L

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.1 kU/L	0.1 kU/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 556275 - 556286 B 250 Bepalen van specifieke IgE per  
antigeen #(Maximum 6)(Cumulregel [47](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

19-06-2025