Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Triglyceriden

Beschrijving van de test

Naam:	Triglyceriden
Aanvraag code:	22050
Loinc:	2571-8
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 90min
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 7 dagen

Analyse

Analysemethode:	Enzymatische colorimetrische fotometrie.
Deelname EKE:	Ja

Interferentie:

1. Hemolyse, Bilirubine (geconjugeerd) >15mg/dL, bilirubine (ongeconjugeerd) >5mg/dL, Intralipid infuus;

2. Etamsylate kan vals verlaagde resultaten veroorzaken

3. N-acetylcysteïne (NAC) en metamizol (Novaminsulfon, Dipyrone) kunnen vals verlaagde waarden veroorzaken (door verstoring van de Trinder-reactie waarop deze test gebaseerd is).

Interpretatie: Cardiovasculaire risicofactor, familiaal of secundair. Component van het Metabool Syndroom (hoge TG, laag HDL, gestoorde glycemie, hypertensie, abdominale obesitas) .
Milde hypertriglyceridemie 150-200 mg/dL
. Matige hypertriglyceridemie >200-500 mg/dL
. Ernstige hypertriglyceridemie >500 mg/dL (preventie van pancreatitis indien >1000 mg/dL).

Eenheid: mg/dL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 19 jaar	47-260 mg/dL	47-260 mg/dL
> 19 jaar	175 mg/dL	175 mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur: 541376 - 541380 B 70 Doseren van triglyceriden #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

15-10-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.