Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Tissue transglutaminase IgA antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Tissue transglutaminase IgA antistoffen
Synoniemen:	TTG
Aanvraag code:	25100
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 week
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Li-heparine tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay); ImmunoCap 250 (ThermoFisher)
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	Opsporing en monitoring van coeliakie (belangrijkste auto-antigen bij coeliakie). Vals negatieve waarden mogelijk bij IgA-

deficiëntie: steeds te interpreteren in combinatie IgA bepaling.
Eenheid: U/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 556231 - 556242 B 400 Opzoeken van anti-gedeamineerd gliadine antistoffen, anti endomysium antistoffen of antistoffen tegen weefsel transglutaminase #(Maximum 2)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

05-02-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.