

MOG antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	MOG antistoffen
Synoniemen:	Anti-MOG, anti-Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein
Aanvraag code:	25246
Frequentie:	Om de 2 weken
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	200 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Indirecte immuunfluorescentie (MOG-getransfecteerde cellen); Manuele methode
Deelname EKE:	nee

Interpretatie:

Antistoffen tegen Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) kunnen geassocieerd zijn met neuromyelitis optica (NMO) of een NMO spectrum ziekte. De bepaling van antistoffen tegen Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (MOG) zou vooral zinvol zijn bij patiënten met (recurrente) neuritis optica en/of myelitis, bij non-MS demyelinisatie en onbegrepen demyelinisatie in het brein indien antistoffen tegen anti-NMO niet aantoonbaar zijn. Echter meer onderzoek is nodig naar pathogenese, therapie en prognose van MOG antilichaam geassocieerde demyeliniserende aandoeningen.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 31.00

Laatst gewijzigd op

02-03-2026