

Androstenedion

Beschrijving van de test

Naam:	Androstenedion
Aanvraag code:	23660
Loinc:	1854-9
Frequentie:	1x/week (meestal op dinsdag)
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 week
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Chemiluminescentie immunoassay (CLIA)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	EKE BIO-RAD EQAS

Interferentie: Hemolyse; icterisch of lipemisch monster.
Interpretatie: Androgeen steroïdhormoon. Verhoogde waarden kunnen voorkomen bij: polycystisch ovarieel syndroom; hirsutisme; congenitale bijnierhyperplasie; Cushing syndroom; ovariumtumor. Lage concentraties kunnen voorkomen bij: bijnierschors insufficiëntie; ovariële insufficiëntie.
Eenheid: ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1.65 ng/mL	1.90 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 559451 - 559462 B 600 Doseran van androstenedion
#(Maximum 1)(Cumulregel [99](#), [210](#), [322](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

04-06-2026