Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Factor XII

Beschrijving van de test

Naam:	Factor XII
Aanvraag code:	13045
Loinc:	3231-8
Frequentie:	2-wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 weken
TAT Dringend:	24 uur (op werkdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Citraat
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	1 mL bloed of 500µL plasma (citraatbuizen echter steeds volledig vullen bij afname)
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 3 uur
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag:

- 3 uur indien bewaard op KT° of frigo
- tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren

Analyse

Analysemethode:	Automatische (optische) meting.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	De aanwezigheid van een lupus anticoagulans kan oorzaak zijn van vals verlaagde waarden.
Interpretatie:	Een geïsoleerde daling van FXII is zeldzaam en kan wijzen op een congenitaal tekort. FXII deficiëntie leidt echter niet tot een verhoogde bloedingsneiging. I.g.v. FXII deficiëntie is de aPTT typisch heel sterk verlengd (tot onmeetbaar).
Eenheid:	%

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 d	13-93 %	13-93 %
1 d-5 d	11-83 %	11-83 %
5 d-30 d	17-81 %	17-81 %
30 d-90 d	25-109 %	25-109 %
90 d-180 d	39-115 %	39-115 %
> 180 d	50-150 %	50-150 %

Tarificatie

Nomenclatuur:	554352 - 554363 B 350 Doseren van factor XII #(Maximum 1) (Diagnoseregel 19) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

07-09-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.