

Rheumafactor

Beschrijving van de test

Naam:	Rheumafactor
Synoniemen:	reumafactor, reumafaktor, RF
Loinc:	11572-5
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24u
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Li-heparine tube
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Immunoturbidimetrie; Atellica CH Analyzer (Siemens)
Deelname EKE:	Sciensano / EQAS
Interferentie:	Hemolyse >200 mg/dL
Interpretatie:	De detectie van RF is belangrijk om een onderscheid te maken tussen reumatoïde artritis en andere reumatische aandoeningen.

Eenheid: IU/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	14.0 IU/mL	14.0 IU/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 556113 - 556124 B 100 Kwantitatieve bepaling van reumafacto (Maximum.1)
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

11-06-2026