

Bloedplaatjes antistoffen (HPA, Glycoproteïne)

Beschrijving van de test

Naam:	Bloedplaatjes antistoffen (HPA, Glycoproteïne)
Synoniemen:	HPA, bloedplaatjesantistoffen
Aanvraag code:	19730
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00003
Loinc:	215
Frequentie:	2 wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	21 dagen
TAT Dringend:	2 dagen
Accreditatie:	Geaccrediteerd door European Federation of Immunogenetics (EFI) ; 02-BE-008.992
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Barbara Cauwelier

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Klonter
Volume:	2,7 mL bloed op klontertube
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname.
Bijaanvraag:	Max. 14d na staalafname

Analyse

Analysemethode:	PakLX op Luminex.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE:

UKNegas, Instand

Interpretatie:

Bloedplaatjesantistoffen kunnen gericht zijn tegen HLA of HPA antigenen en ontstaan nadat er contact is geweest met deze lichaamsvreemde antigenen t.g.v. transfusie, zwangerschap; deze allo-antistoffen kunnen zorgen voor een koortsreactie of PTP (posttransfusiepurpura) of een slechte overleving van bloedplaatjes na transfusie (refractoriteit). Een zwangere vrouw die bloedplaatjesantistoffen ontwikkelt tegen het antigeen op de bloedplaatjes van de fetus, kan zorgen voor een afbraak van de bloedplaatjes van de baby (neonatale alloimmune thrombopenie). Bloedplaatjes antistoffen die gericht zijn tegen antigenen aanwezig bij de persoon zelf (auto-antistoffen; glycoproteïne antistoffen), kunnen een versnelde afbraak geven van de eigen bloedplaatjes: idiopathische thrombocytopenische purpura (ITP).

Tarificatie

Nomenclatuur:

555612 - 555623 B 350 Opzoeken van antithrombocyten antilichamen in het serum (indirecte test) #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 02/12/2025

555656 - 555660 B 1000 Identificatie van specifieke antithrombocyten antilichamen, exclusief de HLA antilichamen #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [24](#))
Bron: RIZIV website op 02/12/2025

Laatst gewijzigd op

14-07-2025

Barbara Cauwelier